



SINCE 2007

**QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN NPK AMINO
VÀ HỮU CƠ DÊ CỦA TRUNG HIỆP LỢI**

LÚA SẠCH

GIẢI ĐOẠN 1: BÓN LÓT - 7 ĐẾN 10 NGÀY SAU SẠ (NSS)

- Giai đoạn đầu tiên rất quan trọng, giai đoạn này cây lúa cần đảm bảo đầy đủ và phù hợp các nguồn dinh dưỡng đạm, lân, kali.
- Sử dụng phân bón **NPK GERMAN 20-10-10+3S** liều lượng **7kg** trên 1 công (1000m²) với hữu cơ dê **PLANT-MATE 15kg** trên 1 công (1000m²).

Lưu ý: - Ở giai đoạn này là giai đoạn ốc phát triển mạnh nên cần sử dụng thuốc BVTV hoạt chất Metaldehyde dạng rải hoặc Abamectin nước đục để trị ốc bươu ăn lúa.



 REFRESH

GIẢI ĐOẠN 2: ĐÈ NHÁNH - 20 ĐẾN 25 NSS

- Sử dụng loại phân bón có hàm lượng lân cao, kết hợp bổ sung các loại hữu cơ sinh học để đảm bảo cây lúa có số lượng nhánh hữu hiệu cao.
- Trước tiên bón rải bằng **NPK WOPROFERT 25-20** với liều lượng **11kg** trên 1 công (1000m²). Sau đó pha **100ml** phân bón amino rong biển **AGAMIN EXTRA** và **100ml** phân bón hữu cơ đạm cá **REFRESH OMEGA 5-1-1** cho **50 lít** nước trên 1 công (1000m²), phun ướt đều cây.

Lưu ý: - Ở giai đoạn này muỗi hành rất phát triển nên cần sử dụng các sản phẩm Thuốc BTVT hoạt chất Alpha-cypermethrin hoặc permethrin để phòng trừ muỗi hành tăng số lượng chồi hữu hiệu.



GIẢI ĐOẠN 3: ĐÓN ĐỒNG - 40 ĐẾN 45 NSS

- Cần đầu tư nhiều thời gian và chăm sóc kỹ lưỡng vào thời gian này nhằm đạt được sản lượng cao cho một mùa vụ.
- Trước tiên sử dụng **NPK GERMAN 16-16-8+6S** với liều lượng **11kg** trên 1 công (1000m²). Sau 3 ngày, sử dụng **10gr** phân bón vi lượng **AGROVIT COMBI** với **100ml** phân bón amino rong biển **AGAMIN EXTRA** cho **50 lít** nước trên 1 công (1000m²).

Lưu ý: - Ở giai đoạn này là giai đoạn bệnh đạo ôn rất là phát triển và ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất nên cần sử dụng thuốc BTVT hoạt chất tricyconazole hoặc hexaconazole.



GIẢI ĐOẠN 4: LÚA TRỎ VÀ NUÔI HẠT - 55 ĐẾN 60 NSS TRỞ VỀ SAU

- Ở giai đoạn này cây lúa cần hàm lượng kali cao để giúp hạt lúa to, sáng mẩy, chắc hạt, nặng bông và không bị lem.
- Sử dụng **NPK WOPROFERT 12-9-17** với liều lượng **11kg** trên 1 công (1000m²). Kết hợp pha **100ml** phân bón amino rong biển **AGAMIN EXTRA** cho **50 lít** nước trên 1 công (1000m²).

Lưu ý: - Ở giai đoạn này bệnh lem lép hạt rất là ảnh hưởng tới năng suất của nông dân nên sử dụng thuốc BTVT hoạt chất difenconazole hoặc propiconazole để phòng trừ bệnh và nâng cao năng suất.

