



SINCE 2007

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRUNG HIỆP LỢI TRÊN SÂU RIÊNG

(GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT)



GIAI ĐOẠN 1: GIAI ĐOẠN LÀM ĐẤT

- Trước khi xuống giống 15 – 30 ngày cần làm đất để bổ sung chất dinh dưỡng cho đất là tiền đề cơ bản để cây phát triển tốt hơn.
- Sử dụng phân **HỮU CƠ DÊ PLANTMATE** với liều lượng 25kg/1000m² kết hợp rải **DIAMOND GROW 100% SOLUBLE HUMIC ACID POWDER** với liều lượng 3kg/1000m² trộn với **NP WOPROFERT 25-20** với liều lượng 25kg/1000m².



Lưu ý: - Ở giai đoạn này cần xử lý tuyền trùng hoặc các sâu hại trong đất bằng các thuốc rải gốc hoặc bón vôi.



REFRESH

GIAI ĐOẠN 2: GIAI ĐOẠN NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và lượng phân bón rễ sẽ tăng 20% theo từng năm.
- Sử dụng **NPK WOPROFERT 20-10-10+3S** rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 4 lần bón trên 1 năm.
- Kết hợp pha **OMEGA 5-1-1** kết hợp với **REFRESH KELP MASTER** với liều lượng 50ml/25 lít nước hoặc tưới gốc 5 lít/cây 7 ngày phun/tưới 1 lần.
- Sử dụng **CUPRIK BLUE SL** với liều lượng 50ml/25 lít nước, 1 năm phun 4 lần cùng với bón phân.

Lưu ý: - Ở giai đoạn này cây rất yếu và cần nước nên luôn giữ độ ẩm cho cây không nên để cây quá khô làm cây bị suy sụp khó phục hồi lại nhưng không nên tưới gốc do việc tưới gốc sẽ làm các nấm bệnh phát triển mạnh và giai đoạn này đợt non phát triển mạnh nên bọ trĩ, rầy phấn trắng, nhện đỏ có nhiều nên cần sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ



REFRESH



SINCE 2007

QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRUNG HIỆP LỢI TRÊN SÂU RIÊNG

(GIAI ĐOẠN KINH DOANH)

GIAI ĐOẠN 3: GIAI ĐOẠN LÀM BÔNG

- Khi cây đã đi được 2 cơi đọt, cơi thứ 2 khi lá đã mở hoàn toàn thì là lúc làm bông sầu riêng.
- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng lân cao để giúp cho lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **GELFOL 0-45-50 + NPK AGASOL 10-55-10 + WOPRO SOP** với liều lượng 50g/25 lít nước phun đều ướt hết lá cây kết hợp với **NUTRICAT Zn-Mn** với liều lượng 6 – 8g/bình 25 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 – 10 ngày

Lưu ý: - Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10 – 15 ngày cây sẽ ra hoa nếu cây không ra hoa thì tùy vào tình trạng của cây mà tưới nước vừa đủ không quá nhiều sao cho vừa ẩm đất(khoảng 1/3 bình thường) sau đó tiếp tục phun để làm bông.



REFRESH



GIAI ĐOẠN 4: GIAI ĐOẠN KÉO MẮT CUA (Sử dụng phân bón gốc)

- Ở giai đoạn này cây cần các nguyên tố trung vi lượng để hình thành hạt phấn và chất lượng của hạt phấn.
- Ở giai đoạn này cần đi thêm một đợt cơi đợt nữa vì đợt cơi đợt này rất quan trọng cho quá trình nuôi trái về sau.
- Giai đoạn này thường kéo dài từ 30 – 45 ngày thì hoa bắt đầu xổ nhụy.
- Sử dụng **NPK WOPROFERT 20-10-10+3S** rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 2 lần bón mỗi lần cách nhau 10 – 15 ngày.

Lưu ý: - Ở giai đoạn này cần kết hợp phun phòng thuốc sâu thuốc bệnh thường xuyên vì giai đoạn này bọ trĩ, nhện đỏ sẽ xuất hiện rất nhiều.



REFRESH





GIAI ĐOẠN 4: GIAI ĐOẠN KÉO MẮT CUA (Sử dụng phân bón lá)



- Khi mắt cua được 3 – 5cm: sử dụng **AGAMIN EXTRA + OMEGA 5-1-1** với liều lượng 50ml/bình 25 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày.
- Sau khi phun lần thứ 2 7 ngày. Sử dụng **DG19 HIGH CANXIBO + THL BO12** với liều lượng 50ml/bình 25 lít nước + **KELKAT B 2,1** với liều lượng 35g/25 lít nước + **NUTRICAT Zn-Mn** với liều lượng 6 – 8g/bình 25 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày, riêng lần cuối cùng sử dụng thêm **KALI TAN** với liều lượng 100g/25 lít nước phun thêm để giúp cơi đợt thứ 3 già nhanh tránh tình trạng cây xổ nhụy mà vẫn đi đợt sễ làm rụng hoa, rụng trái non, giảm tỷ lệ đậu trái.

Lưu ý: - Ở giai đoạn này cần kết hợp phun phòng thuốc sâu thuốc bệnh thường xuyên vì giai đoạn này bọ trĩ, nhện đỏ sễ xuất hiện rất nhiều.



REFRESH



GIAI ĐOẠN 5: GIAI ĐOẠN ĐẬU TRÁI

- Cây sẽ sờ nhụy trong vòng 7 – 10 ngày, ở giai đoạn này không được sử dụng thuốc BVTV hoặc phân bón lá do sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của cây.
- Ở giai đoạn này cây cần nguyên tố trung vi lượng như bo, canxi... để giúp cuống dai hơn, tránh tình trạng rụng trái non.

- Sử dụng **DG19 HIGH CANXIBO + THL BO12 + AGAMIN EXTRA** với liều lượng 50ml/bình 25 lít nước phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày.




REFRESH

GIAI ĐOẠN 6: GIAI ĐOẠN NUÔI TRÁI

- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung nuôi trái.
- Bón gốc sử dụng **NPK WOPROFERT 15-15-15+2S Amino** với liều lượng 1.5kg/cây, bón 3 lần mỗi lần cách nhau 25 – 30 ngày.
- Bón lá sử dụng: **AGAMIN EXTRA** với liều lượng 50ml/25 lít nước + **SOLUCAT 20-20-20** với liều lượng 50g/25 lít nước + **AGROVIT COMBI** với liều lượng 6.25g/bình 25 lít nước + **NUTRICAT Zn-Mn** với liều lượng 6 – 8g/bình 25 lít nước, cách 15 ngày phun 1 lần đến khi trái to từ 3.5 – 4kg.



Lưu ý: - Ở giai đoạn này cây rất hay bị sâu ăn lá đặc biệt là côn trùng nên cần sử dụng thuốc BVTV phòng thường xuyên để giữ bộ lá luôn xanh tốt.




REFRESH



GIAI ĐOẠN 7: GIAI ĐOẠN 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH

- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp trái đẹp, bắt mắt, tăng độ ngọt cho trái.
- Bón gốc sử dụng: **NPK GERMAN 12-9-17** với liều lượng 1,5kg/cây.
- Bón lá sử dụng: **AGAMIN EXTRA** với liều lượng 50ml/25 lít nước.

Lưu ý: - chú ý sầu riêng đang trong giai đoạn có trái thì không sử dụng phân kali đắng(KCL) vì sẽ làm cho sượng trái và ở giai đoạn này tránh sử dụng các thuốc BVTV có độ bám dính cao vì sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và vẻ ngoài của trái ví dụ như mancozeb xanh, vàng....



REFRESH

GIAI ĐOẠN 8: GIAI ĐOẠN RỬA VƯỜN VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn

- Sử dụng **CUPRIK W.G BLUE** với liều lượng 50g/25 lít nước phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.

Lưu ý: - Ở giai đoạn này có thể sử dụng kết hợp thêm các thuốc BVTV khác.

2. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch

- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.

- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày Bón gốc sử dụng: Phân **HỮU CƠ DÊ PLANTMATE** với liều lượng 2kg/cây

- Kết hợp pha **OMEGA 5-1-1 + REFRESH KELP MASTER + AGAMIN EXTRA** với liều lượng 50ml/25 lít nước, 7 ngày phun 1 lần.



REFRESH



GIAI ĐOẠN 9: GIAI ĐOẠN LÀM CƠI ĐỌT

- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm cao để đi đọt, đi lá nhiều để chuẩn bị cho mùa tiếp theo.
- Bón gốc sử dụng: **NPK WOPROFERT 20-10-10+3S** rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 2 lần bón mỗi lần cách nhau 20 ngày.

Lưu ý: - Ở giai đoạn này đọt non phát triển mạnh nên bẹ trĩ, rầy phấn trắng, nhện đỏ có nhiều nên cần sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ.
- Sầu riêng rất dễ bị bệnh nứt thân xì mũ nên trong cả quá trình trồng sầu riêng cần phun thuốc BVTV định kỳ để phòng các sâu bệnh hại cây.



- Kết hợp pha **OMEGA 5-1-1 + REFRESH KELP MASTER + AGAMIN EXTRA** với liều lượng 50ml/25 lít nước hoặc tưới gốc 5 lít/cây, 7 ngày phun 1 lần.



REFRESH

