



TRUNG HIỆP LỢI
WE BRING YOU GREENS

SINCE 2007

CẨM NANG PHÂN BÓN TRÊN CÂY SÂU RIÊNG





ZALO



FACEBOOK

QUÉT MÃ HOẶC LIÊN HỆ  0934 189 778
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ SẢN PHẨM

trunghieploi.com.vn



GIAI ĐOẠN 1: LÀM ĐẤT

- Trước khi xuống giống 15 – 30 ngày cần làm đất để bổ sung chất dinh dưỡng cho đất là tiền đề cơ bản để cây phát triển tốt hơn.
- Sử dụng phân **HỮU CƠ DÊ PLANTMATE** (1) với liều lượng 25kg/1000m² kết hợp rải **DIAMOND GROW 100% SOLUBLE HUMIC ACID POWDER** (2) với liều lượng 3kg/1000m² trộn với **NP WOPROFERT 25-20** (3) với liều lượng 25kg/1000m².

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này cần xử lý tuyến trùng hoặc các sâu hại trong đất bằng các thuốc rải gốc hoặc bón vôi.





GIAI ĐOẠN 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và lượng phân bón rễ sẽ tăng 20% theo từng năm.
- Sử dụng **NPK WOPROFERT 20-10-10+3S** (1) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 4 lần bón trên 1 năm.
- Kết hợp pha **OMEGA 5-1-1** (2) với **REFRESH KELP MASTER** (3) với liều lượng 50ml/25 lít nước phun hoặc tưới gốc, 5 lít/cây, 7 ngày phun hoặc tưới gốc 1 lần.
- Sử dụng **CUPRIK BLUE SL** (4) với liều lượng 50ml/25 lít nước, 1 năm phun 4 lần cùng với bón phân.

Lưu ý:


- Ở giai đoạn này cây rất yếu và cần nước, nên luôn giữ độ ẩm cho cây, không nên để cây quá khô, làm cây bị suy, sẽ khó phục hồi lại, nhưng không nên tủ gốc do việc tủ gốc sẽ làm các nấm bệnh phát triển mạnh và giai đoạn này đợt non phát triển mạnh nên bọ trĩ, rầy phấn trắng, nhện đỏ có nhiều nên cần sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ.



(1)



(2)



(3)



(4)



GIAI ĐOẠN 3: LÀM BÔNG

- Khi cây đã đi được 2 cơi đọt, cơi thứ 2 khi lá đã mở hoàn toàn thì đến giai đoạn làm bông sầu riêng.
- Giai đoạn này cây cần hàm lượng Lân cao để giúp cho lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **GELFOL 0-45-50 (1)** + **NPK AGASOL 10-55-10 (2)** + **WOPRO SOP (3)** với liều lượng 50g/25 lít nước kết hợp với **NUTRICAT Zn-Mn (4)** với liều lượng 6 – 8g/bình 25 lít nước, phun đều ướt hết lá cây, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 – 10 ngày.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10 – 15 ngày cây sẽ ra hoa, nếu cây không ra hoa thì tùy vào tình trạng của cây mà tưới nước vừa đủ không quá nhiều sao cho vừa ẩm đất (khoảng 1/3 lúc bình thường). Sau đó tiếp tục phun để làm bông.



(1)



(2)



(3)



(4)



GIAI ĐOẠN 4: KÉO MẮT CUA (Sử dụng phân bón gốc)

- Giai đoạn này cây cần các nguyên tố trung vi lượng để hình thành hạt phấn và chất lượng của hạt phấn.
- Giai đoạn này cần đi thêm một đợt cơi đợt nữa vì đợt cơi đợt này rất quan trọng cho quá trình nuôi trái về sau.
- Giai đoạn này thường kéo dài từ 30 – 45 ngày hoa bắt đầu xổ nhụy.
- Sử dụng **NPK WOPROFERT 20-10-10+3S (1)** rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 2 lần bón mỗi lần cách nhau 10 – 15 ngày.

Lưu ý:

- Cần kết hợp phun phòng thuốc sâu, thuốc bệnh thường xuyên vì giai đoạn này bọ trĩ, nhện đỏ sẽ xuất hiện rất nhiều.



(1)



GIAI ĐOẠN 4: KÉO MẮT CUA (Sử dụng phân bón lá)

- Khi mắt cua được 3 – 5cm: sử dụng **AGAMIN EXTRA** (1) + **OMEGA 5-1-1** (2) với liều lượng 50ml/bình 25 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày.
- Sau khi phun lần thứ 2 7 ngày Sử dụng **DG19 HIGH CANXIBO** (3) + **THL BO12** (4) với liều lượng 50ml/bình 25 lít nước + **KELKAT B 2,1** với liều lượng 35g/25 lít nước + **NUTRICAT Zn-Mn** (5) với liều lượng 6 – 8g/bình 25 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày, riêng lần cuối cùng sử dụng thêm **KALI TAN** (6)với liều lượng 100g/25 lít nước phun thêm để giúp cơi đợt thứ 3 già nhanh tránh tình trạng cây xổ nhụy mà vẫn đi đợt sẽ làm rụng hoa, rụng trái non, giảm tỷ lệ đậu trái.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này cần kết hợp phun phòng thuốc sâu thuốc bệnh thường xuyên vì giai đoạn này bọ trĩ, nhện đỏ sẽ xuất hiện rất nhiều.





GIAI ĐOẠN 5: ĐẬU TRÁI

- Cây sẽ xổ nhụy trong vòng 7 – 10 ngày, ở giai đoạn này không được sử dụng thuốc BVTV hoặc phân bón lá do sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của cây.
- Ở giai đoạn này cây cần nguyên tố trung vi lượng như bo, canxi... để giúp cuống dai hơn, tránh tình trạng rụng trái non.
- Sử dụng **DG19 HIGH CANXIBO (1) + THL BO12 (2) + AGAMIN EXTRA (3)** với liều lượng 50ml/bình 25 lít nước phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10 – 15 ngày cây sẽ ra hoa nếu cây không ra hoa thì tùy vào tình trạng của cây mà tưới nước vừa đủ không quá nhiều sao cho vừa ẩm đất(khoảng 1/3 lúc bình thường) sau đó tiếp tục phun để làm bông.





GIAI ĐOẠN 6: NUÔI TRÁI

- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung nuôi trái.
- Bón gốc sử dụng **NPK WOPROFERT 15-15-15+2S Amino (1)** với liều lượng 1.5kg/cây, bón 3 lần mỗi lần cách nhau 25 – 30 ngày.
- Bón lá sử dụng: **AGAMIN EXTRA (2)** với liều lượng 50ml/25 lít nước + **SOLUCAT 20-20-20 (3)** với liều lượng 50g/25 lít nước + **AGROVIT COMBI (4)** với liều lượng 6.25g/bình 25 lít nước + **NUTRICAT Zn-Mn (5)** với liều lượng 6 – 8g/bình 25 lít nước, cách 15 ngày phun 1 lần đến khi trái to từ 3.5 – 4kg.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này cây rất hay bị sâu ăn lá đặc biệt là côn trùng nên cần sử dụng thuốc BVTV phòng thường xuyên để giữ bộ lá luôn xanh tốt.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



GIAI ĐOẠN 7: 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH

- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp trái đẹp, bắt mắt, tăng độ ngọt cho trái.
- Bón gốc sử dụng: **NPK WOPROFERT 12-9-17 (1)** với liều lượng 1,5kg/cây.
- Bón lá sử dụng: **AGAMIN EXTRA (2)** với liều lượng 50ml/25 lít nước.

Lưu ý:

Sầu riêng đang trong giai đoạn có trái thì không sử dụng phân kali đỏ(KCL) vì sẽ làm cho sượng trái và ở giai đoạn này tránh sử dụng các thuốc BVTV có độ bám dính cao vì sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và vẻ ngoài của trái ví dụ như man-cozeb xanh, vàng....



(1)



(2)



GIAI ĐOẠN 8: RỬA VƯỜN VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn

- Sử dụng **CUPRIK W.G BLUE** (1) với liều lượng 50g/25 lít nước phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.

2. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch

- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.

- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày Bón gốc sử dụng: Phân **HỮU CƠ DÊ PLANT-MATE** (2) với liều lượng 2kg/cây

- Kết hợp pha **OMEGA 5-1-1** (3) + **REFRESH KELP MASTER** (4) + **AGAMIN EXTRA** (5) với liều lượng 50ml/25 lít nước, 7 ngày phun 1 lần.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này có thể sử dụng kết hợp thêm các thuốc BVTV khác.



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



GIAI ĐOẠN 9: LÀM CƠI ĐỌT

- Ở giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm cao để đi đọt, đi lá nhiều để chuẩn bị cho mùa tiếp theo.
- Bón gốc sử dụng: **NPK WOPROFERT 20-10-10+3S** (1) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 2 lần bón mỗi lần cách nhau 20 ngày.
- Kết hợp pha **OMEGA 5-1-1** (2) + **REFRESH KELP MASTER** (3) + **AGAMIN EXTRA** (4) với liều lượng 50ml/25 lít nước hoặc tưới gốc 5 lít/cây, 7 ngày phun 1 lần.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này đọt non phát triển mạnh nên bẹ trĩ, rầy phấn trắng, nhện đỏ có nhiều nên cần sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ.
- Sâu riêng rất dễ bị bệnh nứt thân xì mủ nên trong cả quá trình trồng sâu riêng cần phun thuốc BVTV định kỳ để phòng các sâu bệnh hại cây.



(1)



(2)



(3)



(4)



PLANTMATE MINERAL ORGANIC FERTILIZER 3-3-6+70 OM

HỮU CƠ DỄ XÀI LÀ MÊ



AMINO RONG BIỂN TINH KHIẾT SIÊU ĐẬM ĐẶC AGAMIN EXTRA

CHẤT HỮU CƠ 22%

AMINO ACID 53,32% (W/V)

CYTOKININ

AUXIN

ĐẬM THỰC VẬT 6,5%

CYTOKININ

**RA HOA ĐỒNG LOẠT
TĂNG KHẢ NĂNG ĐẬU TRÁI
HẠN CHẾ RỤNG HOA VÀ TRÁI NON
KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI**

Agamin Extra
SUPER CONCENTRATED PURE AMINOACIDS

Phân bón hữu cơ
Agamin Extra
AMINO RONG BIỂN TINH KHIẾT SIÊU ĐẬM ĐẶC
SIÊU VỌT ĐÓT - MẠNH RA RỄ
TO TRÁI - TĂNG HÀM LƯỢNG DƯỠNG

KHÍM THỰC VẬT 6,5%
CHẤT HỮU CƠ 22%
AMINO ACID 53,32% (W/V)

AGAFERT
LẮC ĐỘI SẢN PHẨM THUỘC KHÔI SỬ DỤNG

100% TÙÝ
ĐẠT CHỨNG NHẬN
CSQA
PRODOTTO APPROVATO
IFOAM
ACCREDITED
IFOAM STANDARD

**ĐẬM CÁ THỦY PHÂN CÔNG NGHỆ CAO
REFRESH OMEGA 5-1-1**



**GIAU
PROTEIN**

**ĐẬM ĐỘNG VẬT
5%**

**PLUS
AMINO ACID
3.75% (w/w)**



**ĐẬM CHỒI MẠNH - KÉO ĐỘT NHANH
XANH - DÀY - BÓNG LÁ
RA RỄ MẠNH - CẢI TẠO ĐẤT
PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH**

**100% TỪ
TÂY BAN NHA**



ĐẠT CHỨNG NHẬN





**BỘ SẢN PHẨM PHÂN BÓN HÒA TAN
SOLUCAT**

- Dạng bột - Hòa tan nhanh
- Ổn định độ pH
- Bổ sung vi lượng CHELATE

XUẤT XỨ: Tây Ban Nha



Solucat 10-52-10+te Kích thích ra hoa - Nở đồng loạt

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
10%	52%	10%	5%



Solucat 31-11-11+te Bật mầm nhanh - Xanh dày bóng

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
31%	11%	11%	5%



Solucat 10-10-40+te To trái - Tăng hàm lượng đường

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
10%	10%	40%	5%



Solucat 11-40-11+te Ra hoa nhiều - Nhanh già lá

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
11%	40%	11%	5%



Solucat 15-5-35+te Trái to - Mã đẹp

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
15%	5%	35%	5%



Solucat 20-20-20+te To trái - Ngọt trái - Bóng trái

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
20%	20%	20%	5%



Solucat 25-5-5+te Ra lá nhiều - Đẻ nhánh khỏe

Thành phần:

N(ts)	P2O5(hh)	K2O(hh)	Độ ẩm
25%	5%	5%	5%





BỘ SẢN PHẨM PHÂN BÓN HỖN HỢP

NPK AMINO

- Sử dụng 100% Kali trắng SOP
- Bổ sung AXIT AMIN và hoạt chất CHITOSAN

PLUS AMINO - CHITOSAN
HẤP THỤ LIỀN TỤC TRONG 72 TIẾNG



CERTIFICATE ISSUE
BY GERMANY (CHLB ĐỨC)

- Tăng khả năng quang hợp
- Tăng tỉ lệ đậu trái
- Tăng hiệu quả thuốc BVTV

Kích thích phát triển rễ

- Phát triển các vi sinh vật có lợi
- Tăng sức chống chịu với thời tiết

Hạt phân tròn, • | • Hấp thụ liên tục
đều, tan nhanh

NPK GERMAN 15-5-20

Tăng trái - Bóng trái - Tăng độ ngọt

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	Độ ẩm
15%	5%	20%	5%



NPK WOPROFERT 15-15-15+2S

Tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	S	Độ ẩm
15%	15%	15%	2%	5%



NPK GERMAN 16-16-8+6S

Phát đợt nhanh - Đẻ nhánh mạnh

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	S	Độ ẩm
16%	16%	8%	6%	5%



NPK WOPROFERT 20-10-10+3S

Phục hồi nhanh - Đâm chồi mạnh

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	S	Độ ẩm
20%	10%	10%	3%	5%



NPK GERMAN 12-12-17

Tăng khả năng phân hóa mầm hoa

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	Độ ẩm
12%	12%	17%	5%



NPK WOPROFERT 12-9-17

Tăng khả năng phân hóa mầm hoa

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	Độ ẩm
12%	9%	17%	5%



NP WOPROFERT 25-20

Đi đợt mạnh - Đẻ nhánh nhiều

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	Độ ẩm
25%	20%	5%



NPK WOPROFERT 16-16-16

Siêu lớn trái - Đẹp mĩ - Xanh cành lá

Thành phần:

N(ts)	P ₂ O ₅ (hh)	K ₂ O(hh)	Độ ẩm
16%	16%	16%	5%



BỘ SẢN PHẨM NPK AMINO

AXIT AMIN

PENAC P


URE HÓA LỎNG

CHITOSAN

100% KALI TRẮNG


- Phòng trừ các bệnh do nấm, vi khuẩn
- Chứa nhiều dinh dưỡng và khoáng chất
- Tăng sức đề kháng

- Giúp cây trổ nhiều hoa
- Giúp ngọt trái chống sượng trái
- Cây cứng chắc ít đổ ngã



+30% Chất hữu cơ

**CÂY GIẢM STRESS
RA HOA NHIỀU
CHỐNG RỤNG TRÁI NON**



**RA HOA ĐỒNG LOẠT
TĂNG THỰ PHÂN
HẠN CHẾ RỤNG HOA - TRÁI NON**



Phân bón hữu cơ **REFRESH KELP MASTER**

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN



Sản phẩm của tập đoàn OLMIX SA

**RẼ KHỎE - CỨNG CÂY
XANH LÁ - MẬP BÔNG
TRÁI TO - NGỌT VỊ**



SINCE 2007

NUTRICAT

XUẤT XỨ: Tây Ban Nha



Lá xanh
dày vỏ
bóng mượt

Hạn chế
nấm bệnh

Kích kháng
tăng hệ
miễn dịch

Ngăn ngừa
hiện tượng
nhỏ lá

Zn

Zn

Mn

Mn

Phân bón vi lượng
Phân vi lượng bón rễ

NUTRICAT

Zn - Mn 2,8 - 1,7
ZINC AND Manganese CORRECTOR



PRODUCED BY:

Atlántica
Agricultura Natural

Khối lượng tịnh
25gr

Phân bón vi lượng
Phân vi lượng bón rễ

NUTRICAT

Zn - Mn 2,8 - 1,7
ZINC AND Manganese CORRECTOR



PRODUCED BY:

Atlántica
Agricultura Natural

ĐÁT CHỨNG NHẬN
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ



ECOCERT

HÓA CHẤT GỐC ĐỒNG
CUPRIK BLUE WG 85
Cuprik BLUE SL

RỬA VƯỜN SẠCH KHỎE - ĐÁNH BAY NẤM BỆNH



SIÊU PHẨM ĐẾN TỪ **TÂY BAN NHA**



TRUNG HIỆP LỢI

WE BRING YOU GREENS

trunghieploi.com.vn